

- poils condensés à l'extrémité apicale. *R. laeta* Lam.  
 Extrémité apicale des élytres noire sur le quart de  
 leur longueur. *R. borneensis* Rothsch. et Jordan.  
 Abdomen en grande partie vermillon.  
 Base des élytres vermillon.  
 Pronotum tuberculeux. 6<sup>e</sup> article antennaire non  
 épineux..... *R. novempunctata* Westw.  
 Pronotum non tuberculeux. 6<sup>e</sup> article antennaire  
 épineux..... *R. inexpectata* Ritsema.  
 Base des élytres noires. Fémurs longuement clavi-  
 formes..... *R. formosa* Saunders.
- 

**Notes brèves pour aider à la distinction des Longicornes du genre**  
*Mallosia* Muls. [COL. CERAMBYCIDAE]

par Maurice Pic.

En montrant une boîte de sa collection, M. Maurice Pic indique brièvement quelques caractères faciles à voir pour aider à la distinction rapide de la plupart des espèces, races ou variétés qu'il a décrites dans le genre *Mallosia* Muls. (1) qui est un de ceux renfermant les plus belles espèces de la faune paléarctique.

*M. costata* Pic. — Se distingue, à première vue, par les élytres pourvus de côtes très marquées.

*M. Delagrangi* Pic. — Peut se distinguer, à première vue, de *M. mirabilis* Fald. et autres races, par les élytres dépourvus de macules blanches sur les côtés.

Parmi les variétés de *M. Ganglbaueri* Kr., la variété *semirubra* Pic se reconnaît à la coloration foncière plus ou moins roussâtre des élytres; la variété *multimaculata* Pic, en outre des macules peu irrégulières des élytres, se distingue facilement par la suture nettement et régulièrement pubescente.

*M. brevipes* Pic. — Est des plus distinctes, entre toutes les espèces, par ses pattes courtes, très poilues.

(1) Consulter, pour l'étude générale ou plus complète du genre *Mallosia* Muls., M. Pic, Mat. Longic. V, 2, 1905, p. 24 à 36; Mat. Long. VII, 1, 1908, p. 12 à 14.

*M. caucasica* Pic. — Diffère de *M. Herminae* Reitt. et races voisines par les élytres ayant quelques mouchetures fauves sur la suture près de l'écusson et les antennes moins foncées.

*M. Angelicae* var. *Lederi* Pic. — A la pubescence élytrale non complètement mouchetée et en partie réunie sous forme de bandes variables.

*M. armeniaca* Pic. — Cette race de *M. Herminae* Reitt. est très distincte par les épaules non avancées en avant, d'où peu marquées, et les élytres ♂ à peine rétrécis à l'extrémité; elle est plus aplatie et plus courte que la var. *Lederi* Pic de *M. Angelicae* Reitt.

### Deux nouveaux *Hylophilus* Berth. de la presqu'île de Malacca

[COL. HETEROMERA]

par Maurice Pic.

*Hylophilus malaccanus*, n. sp. — *Subelongatus*, *ferè opacus*, *griseo holosericeo pubescens*, *rubro-testaceus*, *elytris nigro-piceis*, *densissime pubescentibus*, *pedibus pro majore parte testaceis*.

Suballongé, presque opaque, seulement un peu brillant sur les élytres qui sont densément garnis d'une pubescence grise soyeuse, roux-testacé avec les élytres d'un noir de poix, base des antennes testacée, le reste foncé, ces organes assez grêles; tête subarquée, yeux grands, rapprochés sur le front; prothorax densément ponctué, presque carré, sinué sur les côtés, peu élargi et subanguleux en avant, orné d'une forte dépression transversale antérieure; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles, courtement rétrécis au sommet, à faible dépression antérieure, fortement ponctués; pattes testacées avec les cuisses postérieures en partie rembrunies, ces dernières faiblement arquées. — Long. : 2,5 mill. environ.

Ressemble beaucoup à *H. sumatrae* Pic; les élytres sont plus courts, le prothorax autrement impressionné, etc.

*Hylophilus Dohertyi*, n. sp. — *Oblongus*, *subnitidus*, *griseo pubescens*, *rufo-testaceus*, *elytris nigropiceis*, *ad basin rufo-testaceis*, *antennis calidis*, *nigris*, *articulis 1-3 testaceis*.

Oblong, peu brillant, orné d'une pubescence grise courte, roux-tes-